

Protocolo uso de EPP Nefrología Procedimientos Paciente con COVID-19
Lista de chequeo Colocación y Retiro de EPP Personal Asistencial

| Nombre | Serv / Turno | Fecha | Observador |
|--------|--------------|-------|------------|
|--------|--------------|-------|------------|

| <input checked="" type="checkbox"/> | Lista de Insumos por persona | P | F | R |
|-------------------------------------|--|---|---|---|
| | Gel anti bacterial a base de alcohol 70% o Rociador alcohol 70% | | | |
| | Rociador Hipoclorito 1:10 o desinfectante de superficies avalado por la institución | | | |
| | Bata manga larga anti-fluido que alcanza por debajo de las rodillas | | | |
| | 2 pares de guantes | | | |
| | Polainas | | | |
| | Gorro | | | |
| | Mascara N95 o FFP3 half mask , fullface | | | |
| | Protección ocular: | | | |
| | • Monogafas | | | |
| | Protección facial: | | | |
| | • Careta visor | | | |
| | Zapatos cerrados | | | |
| | Vestido quirúrgico | | | |
| | Tijeras | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Recomendaciones Iniciales | | | |
| | Asegurar que procedimiento se realiza con el observador entrenado en colocación y retiro de EPP. | | | |
| | Revisar en conjunto los insumos. | | | |
| | Revisar procedimiento: observador entrenado con el personal medico antes de iniciar. | | | |
| | Utilizar lista de chequeo para la colocación y retiro de PPE. | | | |
| | Antes de iniciar: comer beber e ir al baño. | | | |
| | Remover joyas y sujetar cabello. Personal masculino no debe tener barba. Usar zapatos cerrados. No esmalte. | | | |
| | Cambiar de ropa particular o uniforme a un vestido quirúrgico de la clínica. | | | |
| | Observador lee en voz alta pasos de colocación o retiro de EPP. Personal repite ordenes. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Colocación de EPP | | | |
| | Higienizar manos (20 segs y dejar secar). | | | |
| | Colocar Gorro. | | | |
| | Colocar Polainas. | | | |
| | Higienizar manos (20 segs y dejar secar). | | | |
| | Colocar 1er par de guantes. | | | |
| | Realizar pequeña corte en bata de manga larga para colocar pulgar. | | | |
| | Colocar bata de manga larga anti fluido que alcanza por debajo de las rodillas. (abrocharse a la cintura y al cuello - observador puede ayudar con esto, si es necesario). | | | |
| | Colocar FFP2 -N95 o Mascara FFP3 half mask o fullface. | | | |
| | Realizar Verificación de Sello de mascara. | | | |
| | Colocar 2nd par de guantes. | | | |
| | Higienizar manos (20 segs y dejar secar). | | | |
| | Colocar Monogafas. | | | |
| | Colocar Visor facial. | | | |
| | Observador revisa paciente. | | | |
| | Entra a habitación y realizar intervención a paciente según protocolo establecido. | | | |

Protocolo uso de EPP Nefrología Procedimientos Paciente con COVID-19
Lista de chequeo Colocación y Retiro de EPP Personal Asistencial

| Nombre | Serv / Turno | Fecha | Observador |
|--------|--------------|-------|------------|
|--------|--------------|-------|------------|

RECORDATORIOS ESENCIALES

¡DEBE estar presente un Observador Entrenado para monitorear y ayudar con la retirada!

¡DEBE usarse un protocolo de retiro adecuado para reducir el riesgo de exposición!

¡NO toque los ojos, la nariz, la boca, la cara o la piel expuesta durante el procedimiento de retiro de EPP!

| <input checked="" type="checkbox"/> | Retiro de EPP | P | F | R |
|-------------------------------------|--|---|---|---|
| | Salir de habitación y cerrar puerta. | | | |
| | Revisar EPP por defectos. | | | |
| | Higienizar manos con desinfectante de superficies (20 segs y dejar secar). | | | |
| | Asperjar alcohol en cuello, cabeza, pantalones, piernas y polainas. | | | |
| | Retirar Polainas. No cruzar piernas. Retirar desde aspecto posterior de la polaina. Desechar. | | | |
| | Asperjar zapatos con desinfectante de superficies. | | | |
| | Higienizar manos (20 segs y dejar secar). | | | |
| | Retirar bata incluyendo 1er para de guantes externos. Si es necesario el observador puede desatar la bata y le indica verbalmente como se debe se quitar la bata. | | | |
| | Como quitarse la bata y los guantes interiores: <ul style="list-style-type: none"> • Inclínese ligeramente hacia adelante, inclinándose a la altura de la cintura, luego agarre la bata con los brazos cruzados (toque solo la parte externa y pele la bata lentamente, deslícela lejos de usted a medida que avanza. • Enrolle la bata en un paquete manejable, sin permitir que toque su ropa. • Quítese los guantes interiores con la bata, sin tocar la piel desnuda o el interior de los guantes interiores. • Deje caer la bata con guantes exteriores en la caneca de residuos de riesgo biológico. | | | |
| | Higienizar manos (20 segs y dejar secar). | | | |
| | Retirar Visor Facial inclinándose hacia adelante en posición de olfateó (Colocar en recipiente o zona para insumos de reúso). | | | |
| | Higienizar manos (20 segs y dejar secar). | | | |
| | Retirar Monogafas inclinándose hacia adelante en posición de olfateó (Colocar en recipiente o zona para insumos de reúso). | | | |
| | Higienizar manos (20 segs y dejar secar). | | | |
| | Retirar 1. Mascara N-95 inclinándose hacia adelante en posición de olfateó (Colocar en bolsa de papel para reúso) o 2. FFP3 (Colocar en recipiente o zona para insumos de reúso). | | | |
| | Higienizar manos (20 segs y dejar secar). | | | |
| | Retirar gorro. | | | |
| | Retirar 2nd para de guantes. | | | |
| | Higienizar manos (20 segs y dejar secar). | | | |
| | Observador rocía nuevamente cabeza, cuello, pantalones piernas y zapatos con desinfectante. | | | |
| | Observador confirma adecuada técnica de retiro de EPP. | | | |
| | Cambiar vestido quirúrgico y colocar en recipiente de ropa sucia. | | | |
| | Informar a epidemiología fallas en técnica de retiro y posibles riesgos de exposición. | | | |